Uso corretto dei diuretici

Giancarlo Marenzi

- Stresa, 8-9 giugno 2017 -

Risposta Diuretica Adeguata

Dipende da:

- Concentrazione del farmaco all'interno del tubulo renale
- Quantità di sodio disponibile per l'azione del diuretico all'interno del tubulo renale

Determinanti Farmacocinetiche della Risposta Diuretica

- Quantità di diuretico che raggiunge il sito d'azione
 - Concentrazione plasmatica
 - Dose
 - Assorbimento intestinale
 - Volume di distribuzione (legame con le proteine >95%)
 - Clearance renale
 - quantità filtrata dal glomerulo (~0%)
 - quantità riassorbita dal tubulo (~0%)
 - secreta attivamente dal tubulo (~100%)

Diuretici dell'ansa

Sito di secrezione

Sito d'azione

- Sono efficaci solo se possono agire sul versante tubulare del segmento spesso della branca ascendente dell'ansa di Henle
- Secreti nel lume tubulare del tubulo prossimale attraverso i sistemi di trasporto degli acidi organici
- Riducono il riassorbimento di Na, K e Cl

1° messaggio pratico

- Il diuretico non può funzionare in presenza di acidosi
(bisogna prima correggere l'acidosi per ottenere una risposta diuretica)

Curva Dose-Risposta Normale

(diuretico dell'ansa)

Frazione di Escrezione Renale del Sodio

Curva Dose-Risposta

(diuretico dell'ansa)

Normale

Scompenso Cardiaco

2° messaggio pratico

- Il diuretico deve essere somministrato ad una dose sufficiente per evocare una risposta (dose soglia)
- Questa dose è diversa in base alla funzione renale di base del paziente
- Esiste una dose massima di diuretico al di sopra del quale la risposta non può più aumentare.
- Questa dose è influenzata dal grado di attivazione del sistema renina-angiotensina

Il Rebound Post-Diuretico (*“Early Braking”*)

Risposta Compensatoria Acuta alla Terapia Diuretica (Early Braking)

Breve emivita dei diuretici dell'ansa

- natriuresi (6 ore)
- ritenzione di Na⁺ "*post-diuretica*" (18 ore)
 - aumento riassorbimento prossimale di sodio
 - riduzione volume circolante effettivo
 - attivazione SRAA (>FG,>FF)
 - compenso distale al sito d'azione
 - maggior disponibilità distale di sodio
 - aumento aldosterone

Il Rebound Post-Diuretico (*“Early Braking”*)

3° messaggio pratico

- Un singolo bolo/24h di diuretico non necessariamente determina un bilancio idro-salino negativo
- L'effetto sul bilancio idro-salino è influenzato dalla durata della terapia (giorni) e dall'introito di sodio
- La «frenata» del diuretico può essere limitata, o annullata, con boli di furosemide somministrati ogni 6 ore (o di torasemide ogni 12 ore) o con infusione in continuo.

Diuretici nello Scompenso Cardiaco Acuto

- Diuretici a boli?
- Diuretici in infusione continua?

Intermittent Administration of Furosemide vs Continuous Infusion Preceded by a Loading Dose for Congestive Heart Failure*

Bolo 40 mg ev

48-hour urine output with intermittent furosemide

-18.5%

48-hour Na+ excretion with intermittent furosemide

-21.5%

↑ Lahav M et al. Chest 1992

Bolus vs. Continuous Infusion of Loop Diuretics

Tubular concentration

Doses for Continuous Intravenous Infusion of Loop Diuretics

Diuretic	IV Loading dose	Infusion Rate		
		CrCL <25 mL/min	CrCl 25-75 mL/min	CrCl >75 mL/min
Furosemide	40 mg	20 mg then 40 mg/hr (1 g/24 h)	10 mg then 20 mg/hr (500 mg/24 h)	10 mg/hr (250 mg/24 h)
Torsemide	20 mg	10 mg then 20 mg/hr	5 mg then 10 mg/hr	5 mg/hr
Bumetanide	1 mg	1 mg then 2 mg/hr	0.5 mg then 1 mg/hr	0.5 mg/hr

If an adequate response has not occurred after 1 hour, the loading dose should be repeated, and then the infusion rate increased.

Diuretici nello Scompenso Cardiaco Acuto

- Diuretici ad alte dosi?
- Diuretici a basse dosi?

Sito D'azione dei Diuretici

Terapia Diuretica di Associazione

Effect of Adding Spironolactone to Furosemide in a HF Patient Unresponsive to Ordinary Diuretic Therapy

Practical Applications of Intravenous Diuretic Therapy in Decompensated Heart Failure

4° messaggio pratico

- Nel paziente critico preferire terapia diuretica con infusione continua, sempre preceduta da bolo, a dosaggi adeguati alla funzione renale di base
- Se le dosi massime consigliate non sono efficaci, preferire l'associazione con diuretici ad azione sinergica all'ulteriore aumento della dose del singolo diuretico

5°(ultimo) messaggio pratico

- Nel paziente critico non aspettarsi una adeguata risposta diuretica in presenza di fattori che interferiscono con la secrezione tubulare (acidosi, grave insufficienza renale) o con la filtrazione glomerulare (ipoperfusione renale/ipovolemia, aumento della pressione venosa renale, importante attivazione SRA).
- In questo caso correggere prima le alterazioni emodinamiche, metaboliche e neuro-ormonali per ripristinare una normale risposta al diuretico.